



إعداد: أ. صادق كرم
قسم خدمة المجتمع - مركز التدريب



- كيف ينقذ المسعف نفسه**
- يجب ان يهدا المسعف ثم يسعل حتى يخرج الجسم الغريب .
- عند اقرب طاولة او كرسي يقوم المسعف بالضغط على الحافة على الصدر



الانسداد الكلي (الفحة) فاقد الوعي

عند فقدان الوعي نتيجة لتوقف التنفس اتبع الآتي:

- اجعل المصاب مستلقيا على ظهره على سطح صلب.
- اضغط على بطن المصاب.
- افحص فم المصاب.
- اعمل له إنعاش قلبي رئوي مباشرًة (C.P.R)

انسداد المسلك الهوائية للرضيع اقل من سنة

- ضع الرضيع على ذراعك مستندا على فخذك رأسه للأسفل واضرب خمس ضربات على الظهر بين لوحى الكتف (يجب أن يكون الضرب متناسبا مع حجم الرضيع وبقوة مناسبة).
- اضغط على الصدر فوق عظمة القص أسفل الخط الوهمي بين حلمتي الثدي بإصبعين (تجنب الضغط على البطن).



الفحص

عبارة عن انسداد مفاجئ للمرات الهوائية العلوية
بالأجسام الغريبة وغالباً ما تحدث أثناء تناول الطعام.




الانسداد الجزئي (الفحص) للبالغ والطفل

- في حالة الانسداد الجزئي (الفحص) يمكنك إن تسمع صوت التنفس (صفير).
- شجع المصاب على السعال (بدلاً من إن يسحب الهواء للداخل) إلى أن يخرج الجسم الغريب وان لم يخرج طمأن المصاب واذهب خلف المصاب وضع كلتا يديك على بطن المصاب ثم قوم بالضغط على البطن من الأسفل إلى الأعلى إلى أن يخرج الجسم الغريب.
- قد يتتحول الانسداد الجزئي إلى كلي أو يفقد المصاب الوعي.



العلامات والأعراض

- سعال شديد.
- عدم القدرة على التكلم.
- مسك الرقبة.
- ازرقاق الوجه تدريجي.
- فقدان الوعي بشكل تدريجي.



الانسداد الكلي (الفحص) للمصاب الوعي البالغ والطفل

- اضغط على بطن المصاب لمساعدة في إخراج الجسم الغريب من المسالك الهوائية.
- مكان الضغط يجب أن يكون بين السرة والغضروف الخنجري.
- قف خلف المصاب ولف ذراعيك حول المصاب.
- ضع قبضة إحدى اليدين على بطن المصاب والأخرى فوقها.
- اضغط للداخل والأعلى.
- لا تضغط على البطن كل من:- الحامل ، الشخص البدين ، الرضيع (اضغط على الصدر فوق عظمة القص بين حلمتي الثدي).